



УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Подготовка к УЗИ трансабдоминальным способом

Рекомендации по питанию

- За 3 дня до УЗИ следует прекратить прием пищи, вызывающей метеоризм (чернослив, сливы, яблоки, капуста, черный хлеб, бобовые, сдобная выпечка, цельное молоко).
- За 2 суток прекратить прием жирных и жареных блюд, овощей и фруктов без тепловой обработки, шоколада, газированных, спиртных напитков.
- Последний прием пищи за 18 часов накануне УЗИ.
- За один час до исследования следует выпить 1-1,5 литра чистой питьевой воды или не крепкого несладкого чая.

Порядок проведения:

- Пациент освобождает от одежды нижнюю часть живота и ложится на спину на кушетке.
- Врач наносит на исследуемую область специальное средство, улучшающее прохождение звуковых волн через ткани организма.
- Затем он водит специальным датчиком по животу пациента, а результаты отображаются на мониторе и фиксируются в протоколе.

Подготовка к УЗИ трансректальным способом

Рекомендации по питанию

- За 1-2 дня рекомендуется придерживаться диеты, препятствующей повышению газообразования: не переедать, исключить прием жареной, копченой, жирной, соленой, острой пищи.
- В день обследования опорожнить кишечник естественным путем или с помощью очистительной клизмы.
- За один час до УЗИ следует выпить 1-1,5 литра чистой питьевой воды или не крепкого несладкого чая.

Порядок проведения:

- Пациент раздевается, размещается на кушетке в положении лежа на боку и согнув ноги в коленях.
- Врач надевает на датчик защитное средство (презерватив) и смазывает его гелем для лучшей передачи ультразвука.
- Датчик вводится в прямую кишку пациента, данные передаются на экран.
- Врач анализирует данные, составляет заключение.